



RECOMENDACIONES FRENTE AL BROTE DE RINONEUMONITIS EQUINA

En lo referente a las medidas que se están adoptando debido al brote emergente de Herpesvirus equino tipo I (EHV-1), detectado en el CES Valencia Spring Tour, la RFHE ha decidido suspender las competiciones nacionales durante el próximo fin de semana (4 al 7 de marzo). Se trata de una situación alarmante ya que se trata del brote de EHV-1 más grave en Europa en décadas. Además, esta cepa es particularmente agresiva. A día de hoy se han notificado casos positivos relacionados en Francia, Bélgica y Alemania. Las manifestaciones clínicas pueden variar desde una leve sintomatología respiratoria, así como abortos o cuadros neurológicos graves.

Dado que la principal labor de la RFHE, y por ende, de la FHA es el cuidado y mantenimiento de la salud y el bienestar de los caballos, se recomiendan las siguientes medidas:

- Limitar al máximo los movimientos de caballos y, en todo caso, siempre con el estricto cumplimiento de las medidas para la trazabilidad de los mismos hasta que se recomiende lo contrario (todo depende de la evolución del número de contagios).
- Control estricto de la entrada y salida de los animales de las explotaciones, ya sean comerciales o domésticas.
- Cuarentenar: los animales que procedan de explotaciones con animales positivos o explotaciones colindantes a ellas.
- Avisar a su veterinario ante la aparición de los siguientes síntomas: depresión, fiebre, mocos, tos, disminución del apetito, incoordinación, ataxia.

El diagnóstico se realiza por PCR de hisopo nasofaríngeo o sanguíneo. En lo que se refiere a la vacunación, esta es recomendable dado que reduce la viremia y, por lo tanto, disminuye la probabilidad de infección. Sin embargo, la vacuna no es eficaz frente a la forma neurológica.

Arantza Vitoria Moraiz

Asesora veterinaria de la F.H.A

